

Luxation congénitale de la hanche



Dénominations

Maladie luxante de hanche

Luxation congénitale de hanche

Dysplasie luxante de hanche

Instabilité congénitale de hanche

Terminologie

l'instabilité "maître symptôme de la LCH" se définit de la façon suivante : une hanche est dite instable lorsque la tête fémorale est sortie ou peut sortir en partie ou en totalité de la cavité acétabulaire. Elle peut être mise en évidence de façon inconstante lors des manoeuvres cliniques se traduisant par un ressaut ou un piston.

Dysplasie, Subluxation et Luxation définissent les lésions anatomopathologiques

Examen clinique répété +++

- Le 1er jour de vie en salle de travail
- Avant la sortie de la maternité
- Au 1er, 2ème et 3ème mois
- Lors de tout examen du nourrisson

Attention particulière: **risque**

- Accouchement par le siège
- Gros poids de naissance
- Césarienne
- Oligo-hydramnios
- Primiparité
- Gémellité
- ATCD familiaux de boiterie
- Sexe féminin
- Géographie, malf^o associées,

Attitude spontanée des Mb inf



Recherche de la posture foetale

on « replie » le bébé

posture habituelle en **ABDUCTION**


postures luxantes en **ADDUCTION**












ressaut franc



ressaut discret



piston

La manœuvre d'Ortolani




La manoeuvre de Barlow










Prise en charge





Coussin d'abduction

Harnais de pavlik





